



## «Αύξηση και ανάπτυξη των πρόωρων νεογνών, μετά την έξοδο από τη Μ.Ε.Ν.Ν. Τι πρέπει να γνωρίζει ο Παιδίατρος»

Συντονίστρια  
Χριστίνα Καραολή

Πρόεδρος Εταιρείας Περιγεννητικής Ιατρικής Κύπρου

### ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

**18:30 - 18:45**

**Εισαγωγική Ομιλία**  
**Χριστίνα Καραολή**

**18:45 - 19:15**

Μικροβίωμα εμβρύου:  
Μύθος ή πραγματικότητα;

**Ομιλήτρια:**

**Μαρία Λιθοξοπούλου**

Διευθύντρια Β' Νεογνολογικής  
Κλινικής ΑΠΘ, Νοσοκομείο  
Παπαγεωργίου Θεσσαλονίκης

**19:15 - 19:45**

Υποστήριξη της θρέψης μετά  
την έξοδο από τη Μ.Ε.Ν.Ν.

**Ομιλήτρια:**

**Ελισάβετ Διαμαντή**

Καθηγήτρια Παιδιατρικής -  
Νεογνολογίας ΑΠΘ, Νοσοκομείο  
Παπαγεωργίου Θεσσαλονίκης

**19:45-20:15**

Έγκαιρη ανίχνευση  
νευροαναπτυξιακών διαταραχών  
στα πρόωρα νεογνά.

**Ομιλήτρια:**

**Χριστίνα Καραολή**

Καθηγήτρια Παιδιατρικής -  
Νεογνολογίας  
Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου  
Λευκωσίας  
Τ.Διευθύντρια ΜΕΝΝ-Παιδιατρικής  
Νοσ. Αρχ. Μακάριος III, Λευκωσία  
Πρόεδρος Εταιρείας  
Περιγεννητικής Ιατρικής Κύπρου

**20:15 - 21:00**

Ερωτήσεις - Συζήτηση  
με τους ειδικούς

Σύστημα **Friso** για τις διατροφικές ανάγκες  
πρόωρων ή και ελλιποβαρών βρεφών

**Frisolac**  
Premature

**Frisolac**  
Post Discharge



Αντιπρόσωπος για την Κύπρο:  
**VHP HADJIPANAYIS**

#### ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ

- Το μητρικό γάλα αποτελεί την καλύτερη τροφή για τα βρέφη.
- Οι μητέρες θα πρέπει να ενημερώνονται και να καθοδηγούνται από τους επαγγελματίες υγείας σχετικά με τη σπουδαιότητα και τα πλεονεκτήματα της έναρξης και διατήρησης του θηλασμού, των κοινωνικών και οικονομικών επιπτώσεων που μπορεί να έχουν και τους κινδύνους από τη μη ορθή χρήση του.
- Η σίτιση του βρέφους με μπιμπερό μπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις στη διατήρηση - συνέχιση του θηλασμού.
- Οι μητέρες θα πρέπει να ενημερώνονται από τους επαγγελματίες υγείας για το σωστό τρόπο φύλαξης - προετοιμασίας των τυποποιημένων βρεφικών γαλάτων.